

Avefría


Vanellus vanellus

ESTATUS Y ABUNDANCIA

Sedentario y reproductor escaso.

Migrante abundante.

Invernante abundante.




ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT

Se encuentra distribuida por los embalses de Santillana y El Pardo, la vega media del Jarama, la del Henares y la del Tajo en el municipio de Aranjuez. La población reproductora de avefría es muy pequeña, con 44-49 parejas a principios de los 90. En esos años la principal colonia se situaba en Aranjuez, con más de 25 parejas. Se considera que es una colonizadora reciente, con la primera cría comprobada en 1990 en Valdeolmos.

Un censo de aves acuáticas nidificantes en los ríos de la Comunidad de Madrid en 1997 estimó una población de 8-19 parejas criando, distribuidas por el Jarama bajo (1-5 parejas), Tajo bajo (3-7 parejas) y Torote (4-7 parejas). No existe información reciente de la situación y evolución de la población madrileña de avefría.

Parece preferir playas de guijarros en colas de embalses, orillas e islas de ríos y graveras, y prados húmedos.



Distribución de la avefría durante la época de cría según el atlas de aves nidificantes en España, que recoge datos desde principios de los 90 hasta 2001.

MOVIMIENTOS E INVERNADA

La avefría es un migrante e invernante abundante en la comunidad. Su abundancia puede variar dependiendo de los temporales de frío y las condiciones atmosféricas en sus lugares de origen. Las aves invernantes proceden principalmente del centro y norte de Europa. Los grupos de migrantes empiezan a llegar pronto, alcanzando su máximo tamaño en pleno invierno, cuando pueden alcanzar los pocos miles.

Se puede encontrar en buena parte de la comunidad, con las mayores poblaciones moviéndose por la zona sur, especialmente en las vegas de los ríos Tajo y Jarama. Es más escaso en las zonas medias y falta casi completamente en las zonas altas de la sierra.

El núcleo con las mayores abundancias se encuentra en la vega del Tajo, en el municipio de Aranjuez. También es frecuente en la vega del río Jarama, por Titulcia-Ciempozuelos, San Martín de la Vega hasta Mejorada del Campo y aguas arriba en los campos de Fuente el Saz y Valdetorres del Jarama, o hasta el entorno del Arroyo Torote (Henares). Los embalses del pie de sierra (Santillana y en menor medida El Pardo, El Atazar y El Vellón) albergan pequeños bandos.

En invierno ocupa con preferencia los eriales, mientras que los cultivos de regadío o en mosaico con secanos presentan abundancias menores, pero también considerables.



Distribución invernal de la avefría.

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION

Catalogada como de interés especial en el catálogo regional de especies amenazadas.

BIBLIOGRAFÍA

- Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la Categoría de Árboles Singulares. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 85, de 9 de abril de 1992.
- Del Moral, J. C.; Molina, B.; De la Puente, J. y Pérez-Tris, J. (ed.) 2002. Atlas de las aves invernantes de Madrid 1999-2001. SEO-Monticola y Comunidad de Madrid. Madrid.
- Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzaneque, A. y Sánchez, A. (ed.) 1994. Atlas de las aves nidificantes en Madrid. Sociedad Española de Ornitología-Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- Martí, R. y Del Moral, J. C. (ed.) 2003. Atlas de las aves reproductoras de España. DGCN-SEO. Madrid.
- Martínez, F. 1990. Noticiario Ornitológico. Avefría (*Vanellus vanellus*). Ardeola, 37: 338.
- Martínez, F.; Rodríguez, R. y Velasco, 1996. Situación de la avefría (*Vanellus vanellus*) en España durante el período reproductor. En, J. Fernández Gutiérrez & J. Sanz-Zuasti (ed.):

Conservación de las Aves Esteparias y su Hábitat, pp. 239-256. Junta de Castilla y León. Valladolid.

- Velasco, T. y Blanco, G. 1998. Las aves acuáticas nidificantes en los ríos de la Comunidad de Madrid. Anuario Ornitológico de Madrid 1997: 96-101.

Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña.