

Perdiz roja*Alectoris rufa***ESTATUS Y ABUNDANCIA**

Sedentaria y reproductor abundante.

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT

Se distribuye por toda la comunidad, faltando únicamente en el centro urbano de la ciudad de Madrid. Ocupa una gran variedad de hábitats, aunque prefiere los cultivos cerealistas del sur. También está presente, en mucha menor medida, en encinares adehesados y otras formaciones arbóreas abiertas (olivares, enebrales y coscojares); así como diferentes tipos de formaciones arbustivas como piornales, retamares o jarales.


Es una especie de gran estabilidad poblacional y, a partir de los datos del programa de seguimiento de aves comunes reproductoras en España (SACRE), se estima un tamaño poblacional de 163.583 aves como promedio de su abundancia durante el periodo 2004-2006, que supone el 1,6 % de la población española. El valor mínimo y máximo de esta estima media es de 134.613 y 196.493 individuos.

No es muy frecuente en los sotos fluviales madrileños, con densidades máximas de 2,55 aves/10 ha en el Jarama bajo y 2,08 aves/10 ha en el Tajo bajo. En los espacios gestionados por Patrimonio Nacional en Madrid se le ha registrado en encinares de el Pardo (0,52 aves/10 ha).


MOVIMIENTOS E INVERNADA

La distribución invernal de la perdiz roja coincide con la de primavera. Las mayores abundancias se encuentran en las áreas más térmicas, especialmente en los hábitats abiertos: cultivos de secano, paisajes agrícolas en mosaico y matorrales de escasa cobertura.

Aparece con más frecuencia en los agrosistemas de secano por un lado y en los matorrales de gran porte por otro (coscojares, enebrales y sabinars). Se dan



Distribución de la perdiz roja durante la temporada de cría.



Distribución invernal de la perdiz roja. El azul oscuro corresponde a las zonas de mayor abundancia.

frecuencias menores en ambientes de menor variedad ambiental como son los retamares, matorrales de escaso porte y cobertura (cantuesares y tomillares), olivares, encinares o pastizales de pie de sierra.

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION

No incluida en el catálogo regional de especies amenazadas y considerada en la categoría de datos insuficientes en el libro rojo de las aves de España.

Al ser una especie sometida a una gran presión cinegética, su estado de conservación está estrechamente ligado a una correcta gestión.

BIBLIOGRAFÍA

- Carrascal, L. M. y Palomino, D. 2008. Las aves comunes reproductoras en España. Población en 2004-2006. SEO/BirdLife. Madrid.
- Del Moral, J. C.; Molina, B.; De la Puente, J. y Pérez-Tris, J. (ed.) 2002. Atlas de las aves invernantes de Madrid 1999-2001. SEO-Monticola y Comunidad de Madrid. Madrid.
- Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzanares, A. y Sánchez, A. (ed.) 1994. Atlas de las aves nidificantes en Madrid. Sociedad Española de Ornitología-Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- Madroño, A.; González, C. y Atienza, J. C. (ed.) 2004. Libro rojo de las aves de España. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
- Moreno-Opo, R. y Seoane, J. 2004. Descripción y cuantificación de la comunidad de aves reproductoras en los espacios gestionados por Patrimonio Nacional en el centro de España. Anuario ornitológico de Madrid 2003: 52-73.
- Palomino, D.; Escandell, V. y Del Moral, J. C. 2006. Tendencias poblacionales de la avifauna madrileña: diez años de programa SACRE. Anuario ornitológico de Madrid 2005: 24-43.
- Velasco, T. y Blanco, G. 2001. Avifauna nidificante en los sotos fluviales de la Comunidad de Madrid. Anuario ornitológico de Madrid 2000: 56-67.

Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña.