

Gaviota reidora

Larus ridibundus

ESTATUS Y ABUNDANCIA

Estival y reproductor ocasional.
Invernante abundante.

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT

La gaviota reidora es un ave estival en la comunidad y se reproduce de forma ocasional. Se conocen varios casos de cría confirmada a mediados de los noventa en graveras del río Jarama, y con posterioridad sólo hay publicado otro intento de cría en una laguna situada en Meco. En todos los casos el número de parejas es muy bajo, aunque esto no quita que durante el verano se vean grupos de varias decenas de gaviotas en los ríos del sureste. Estas aves formarían parte del contingente que no llega a abandonar Madrid tras el invierno, aunque no críen. Ni en el atlas de aves nidificantes en Madrid ni en el censo de gaviotas (2007-2009) se comprobó la reproducción en nuestra comunidad. En el atlas de aves reproductoras de España aparece criando en 3 cuadrículas del sur, pero desconocemos datos concretos de esas citas.

Estas son las citas de cría publicadas hasta el momento:

1995


- Velilla de San Antonio, en un pequeño islote en las graveras junto al río Jarama, siete parejas instalan nidos en la primavera y, al menos, tres sacan pollos.
- San Martín de la Vega, en una isla de las graveras se instalan cuatro parejas y fracasan todas.

1996

- Velilla de San Antonio, graveras, 2 adultos en plumaje nupcial el 18.5.1996.
- Velilla de San Antonio, graveras Pioneer, 4 parejas construyendo nidos en isleta el 7.5.1996, el 24.5.1996 se comprueba que la zona ha sido inundada y se han perdido los nidos.
- Velilla de San Antonio, el 9.6.1996 un adulto echado en una isla, continúa echado el 22.6.1996, siendo finalmente depredado el nido por gaviota sombría.

2009

- Meco, se instalan tres parejas en un humedal estacional en la primavera; dos fracasan y una de ellas saca adelante, al menos, un pollo.




Localidades donde ha criado la gaviota reidora. En gris, cuadrículas proveniente del atlas de aves reproductoras de España. Puntos negros, resto de citas publicadas.


MOVIMIENTOS E INVERNADA

La primera cita registrada de gaviota reidora en la Comunidad de Madrid data de 1955, cuando se observaron gaviotas reidoras invernantes en el lago de la Casa de Campo. Aunque no se sabe desde cuándo lo llevan haciendo, su número ha ido aumentando desde principios de los 80, cuando se comienzan a censar las gaviotas invernantes en España. En esos años el contingente de aves sumaba unas 20.000 aves, alcanzando las 125.500 en 2008. Hasta ese año el ascenso se ha producido con algunos altibajos. Como se puede ver en la gráfica, a partir de ese máximo, el número de gaviotas se ha desplomado, sin que se sepa el motivo. Se ha apuntado la competencia con la gaviota sombría, que ha incrementado de forma notable su presencia invernal recientemente.

Las gaviotas madrileñas duermen en masas de agua extensas como graveras y embalses. La mayor concentración para pasar la noche se produce en las graveras del Porcal, seguida del embalse de Santillana. Otros embalses pueden ser también utilizados como dormitorio de forma temporal. Al amanecer, las aves se dirigen en grandes grupos hasta los vertederos de residuos sólidos urbanos, donde encuentran comida fácil y rápida. El vertedero de Valdemingómez es el que alberga mayor número de individuos, aunque también usan otros como el de Colmenar Viejo, Alcalá de Henares o Mejorada del Campo. Durante el día se pueden observar aves en diferentes ríos, humedales y embalses de Madrid, gracias a pequeños desplazamientos que realizan aparte de los movimientos dormitorio-comedero.



Distribución invernal de la gaviota reidora según el atlas de aves invernantes en Madrid.



Evolución de la invernada de gaviota reidora en la Comunidad de Madrid.

Los individuos invernantes en Madrid proceden, fundamentalmente, de los países centroeuropeos, Escandinavia e Islas Británicas. Las mayores cifras se registran en enero y febrero, con una presencia muy reducida entre mayo y agosto.

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION

No incluida en el catálogo regional de especies amenazadas.

BIBLIOGRAFÍA

- Bermejo, A.; Carrera, E.; de Juana, E. y Teixeira, A. 1986. Primer censo general de gaviotas y charranes (*Laridae*) invernantes en la Península Ibérica. *Ardeola*, 33(1-2): 47-68.
- Cantos, F. 2001. La gestión de los residuos sólidos urbanos y las especies generalistas. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001. *Anuario ornitológico de Madrid* 2000: 110-117
- Cantos, F. 2002. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2001-2002. *Anuario ornitológico de Madrid* 2001: 150-152.
- Cantos, F. 2003. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2002-2003. *Anuario ornitológico de Madrid* 2002: 134-135.
- Cantos, F. 2004. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2003-2004. *Anuario ornitológico de Madrid* 2003: 122-123.
- Cantos, F. 2005. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2004-2005. *Anuario ornitológico de Madrid* 2004: 160-161.
- Cantos, F. 2006. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2005-2006. *Anuario ornitológico de Madrid* 2005: 128-129.
- Cantos, F. 2007. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2006-2007. *Anuario ornitológico de Madrid* 2006: 92-93.
- Cantos, F. y Asensio, B. 1990. Evolución de la invernada de gaviota reidora (*Larus ridibundus*) en Madrid. *Ardeola*, 37(2): 305-308.
- Cantos, F. y otros 1994. Noticiario ornitológico. Gaviota reidora (*Larus ridibundus*). *Ardeola*, 41(1): 99.
- Cantos, F. y Serrano, M. 2009. Evolución de la invernada y fenología de las gaviotas reidora (*Larus ridibundus*) y sombría (*Larus fuscus*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario ornitológico de Madrid* 2007-2008: 148-157.
- De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1997. *Anuario ornitológico de Madrid* 1996. SEO-Monticola. Madrid.
- De la Puente, J.; Pérez-Tris, J.; Juan, M. y Bermejo, A. (ed.) 2007. *Anuario ornitológico de Madrid* 2006. SEO-Monticola. Madrid.
- Del Moral, J. C.; Molina, B.; De la Puente, J. y Pérez-Tris, J. (ed.) 2002. Atlas de las aves invernantes de Madrid 1999-2001. SEO-Monticola y Comunidad de Madrid. Madrid.
- Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzanque, A. y Sánchez, A. (ed.) 1994. Atlas de las aves nidificantes en Madrid. Sociedad Española de Ornitología-Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- Díez Ponce de León, P. y Sáez-Royuela, R. 1955. Aves invernantes en el estanque de la Casa de Campo. *Ardeola*, 2: 23-26.

- Gómez, L. y de Juana, E. 1984. Aspectos de la invernada de *Larus ridibundus* en Madrid. *Ardeola*, 31: 123-128.
- Grupo Ornitológico el Pardo 1997. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1996-1997. *Anuario ornitológico de Madrid* 1996: 33-37.
- Grupo Ornitológico El Pardo 1998. Invernada de Láridos en la Comunidad de Madrid: invernada 1997-1998. *Anuario ornitológico de Madrid* 1997: 102-103.
- Grupo Ornitológico El Pardo 1999. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999. *Anuario ornitológico de Madrid* 1998: 144-145.
- Marchamalo, J. y Fernández, I. 1995. Noticiario ornitológico. Gaviota reidora (*Larus ridibundus*). *Ardeola*, 42: 224.
- Marchamalo, J., López Septiem, J. A., Martínez, F. y Fernández, I. 1995. Noticiario ornitológico. Gaviota reidora (*Larus ridibundus*). *Ardeola*, 42(2): 224.
- Martí, R. y Del Moral, J. C. (ed.) 2003. Atlas de las aves reproductoras de España. DGCN-SEO. Madrid.
- Molina, B. (ed.). 2009. Gaviota reidora, sombría y patiamarilla en España. Población en 2007-2009 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
- Serrano, M. y Cantos, F. 2013. Gaviota sombría, la nueva reina del invierno en Madrid. *Quercus*, 331: 16-23.
- Talabante, C. y Aparicio, A. 2009. Noticiario ornitológico. Gaviota reidora (*Larus ridibundus*). *Ardeola*, 56(2): 357.

Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña.